

BEHANDELPLAN SCHAAP EN GEIT

NORMAAL WAARDEN

Lammeren

- Ademhaling 20-30 per minuut
- Hartslag 80-120 per minuut
- Temperatuur 38.5-40.5 °C

Schapen

- Ademhaling 20-30 per minuut
- Hartslag 70-90 per minuut
- Temperatuur 38,5-40 °C

AANDOENINGEN BIJ LAMMEREN

DIARREE (EERSTE LEVENSWEKEN)

- Elektrolietenmix
 - 100-150ml per keer. 6 tot 8 keer daags. In de bek.
 - Wachtijd: geen
- Sulfatrim tablet (cascade)
 - 30mg/kg. 2 keer daags. In de bek
 - Wachtijd: 28 dagen voor vlees.

Als de lammeren niet meer drinken, dierenarts bellen voor advies. Vocht is essentieel voor de lammeren, evt. via een sonde of infuus. Belangrijk is de lammeren melk te blijven geven, afgewisseld met de electrolytenoplossing.

DIARREE (VANAF 3 WEKEN)

- Baycox multi
 - 0,4ml per kg. Éénmalig. In de bek.
 - Wachtijd: 42 dagen voor vlees.

Vanaf een leeftijd van 3 weken is coccidiose een veel voorkomende oorzaak van diarree bij lammeren. Vanaf een leeftijd van 6 weken kunnen worminfecties de oorzaak zijn. Coccidiose en een worminfectie kunnen aangetoond worden in de mest. Laat eerst mestonderzoek doen op de praktijk en behandel op basis van de uitslag!

ONTSTOKEN OOG

- Opticlox
 - Enkele druppelen. 3 keer daags voor 3 dagen. In het oog.
 - Wachtijd: 0 dagen voor vlees
- Ophtocycline (cascade)
 - 2cm zalf. 4 keer daags, voor 5 dagen. In het oog.
 - Wachtijd: 1.5 dag voor vlees.

Vaak is entropion (naar binnen gekrulde oogrand) de oorzaak van de ontsteking. Bel de dierenarts om een krammetje te laten plaatsen.

NAVELONTSTEKING

- Depocilline
 - 1ml per 20kg. Één keer daags, voor 5 dagen. In de spier.

- Wachtijd: 7 dagen voor vlees.

GEWRICHTSONTSTEEKING

- Depocilline
 - 1ml per 20kg. Één keer daags, voor 10 dagen. In de spier.
 - Wachtijd: 7 dagen.

Gezwollen, pijnlijke en warme gewrichten. Koorts en kreupelheid

ZERE BEKJES

- Jodium
 - Op de aangedane plekken sprayen totdat de plekken zijn verdwenen.
 - Wachtijd: 0 dagen.

Bij ernstige gevallen: bel de dierenarts. Vaccineren tegen zere bekjes is mogelijk.

LONGONTSTEEKING

- Flordofen (cascade)
 - 1 ml per 15kg. Na 48 uur herhalen. In de spier.
 - Wachtijd: 45 dagen voor vlees.

PIJNSTILLING

- Novem 20 (cascade)
 - 1ml per 20kg. 1 keer per 2 dagen. Onder de huid.
 - Wachtijd: 23 dagen voor vlees.

OOIEN

ZWAAR AFLAMMEREN

- Depocilline
 - 1ml per 20kg. Één keer daags, voor 5 dagen. In de spier.
 - Wachtijd: 7 dagen voor vlees.
- Oxytocine
 - 2ml per dier. 1 keer daags. Eventueel elke 2 uur. In de spier.
 - Wachtijd: 0 dagen voor vlees.

Oxytocine zorgt ervoor dat de baarmoeder krimpt. Later dan 24uur na aflammeren, heeft oxytocine spuiten geen zin meer.

ABORTUS

Overleg met de dierenarts bij méér abortus gevallen dan normaal of wenselijk.

DIARREE

Laat altijd mest onderzoeken op de aanwezigheid van wormeieren.

UIERONTSTEEKING

- AlamycineLA 200
 - 1ml per 10kg. Eenmalig. In de spier.
 - Wachtijd: 20 dagen voor vlees.
- Mamyzin (cascade)
 - 10ml. 1x daags voor 3 dagen. In de spier.
 - Wachtijd: 15 dagen voor vlees.

Bij een ernstige vorm van mastitis waarbij een uierhelft blauw en koud wordt. Bel dierenarts voor overleg.

BAARMOEDERONTSTEKING

- AlamycineLA 200
 - 1ml per 10kg. Eenmalig. In de spier.
 - Wachtijd: 20 dagen voor vlees.

ONTSTOKEN/OPEN WOND

- Engemycine-spray
 - 3sec sprayen. 2x daags. Voor 3 dagen. Op de huid.
 - Wachtijd: 0 dagen voor vlees
- Depocilline Depocilline
 - 1ml per 20kg. Één keer daags, voor 3 dagen. In de spier.
 - Wachtijd: 7 dagen voor vlees.
- Klik 5% pour on
 - Voor dosering zie verpakking. 1 keer in de 16 weken. Op de huid.
 - Wachtijd: 40 dagen voor vlees.

Bij ontstoken wonden is de preventie van myiasis (madenziekte) belangrijk.

SLEPENDE MELKZIEKTE

- Propyleenglycol
 - 30ml per dier. 2 keer daags. Voor 4 dagen. In de bek.
 - Wachtijd: 0 dagen voor vlees.
- Catosal
 - 10ml per dier. 1 keer daags. Voor 3 dagen. In de spier.
 - Wachtijd: 0 dagen voor vlees. 1 dag.
- Calcitat50
 - 10ml per dier. 1x daags. Onder de huid
 - Wachtijd: 1 dag voor vlees.

Bij ernstige slepende melkziekte; bel de dierenarts. Het kan nodig zijn een infuus met glucose te geven of de geboorte op te wekken.

ROTKREUPEL

- Zinkbad (15 minuten) of zink spray.
- AlamycineLA 200
 - 1ml per 10kg. Eenmalig. In de spier.
 - Wachtijd: 20 dagen voor vlees.

Rotkreupel is meestal een koppelprobleem, neem contact op met de dierenarts om te overleggen over een plan van aanpak. Vaccineren tegen rotkreupel is mogelijk.

ONTSTOKEN OOG

- Opticlox
 - Enkele druppelen. 3 keer daags voor 3 dagen. In het oog.
 - Wachtijd: 0 dagen voor vlees
- Ophthocycline (cascade)
 - 2cm zalf. 4 keer daags, voor 5 dagen. In het oog.
 - Wachtijd: 1.5 dag voor vlees.

PIJNSTILLING

- Novem 20 (cascade)
 - 1ml per 20kg. 1 keer per 2 dagen. Onder de huid.
 - Wachtijd: 23 dagen voor vlees.

ONTWORMEN

Behandelen altijd op basis van mestonderzoek. Onnodig behandelen kost niet alleen geld, maar werkt ook resistentie tegen wormmiddelen in de hand.

Soorten wormen:

- **Nematodirus Battus**; geeft waterdunne diarree, vooral in het voorjaar bij de lammeren. Dieren hebben dorst en een vieze achterhand.
- **Haemonchus contortus**; geeft bloedarmoede en bleke slijmvliezen. Geen diarree! Vooral klachten in juli en augustus
- **Teladorsagia/ tristrongylus**; geven diarree, in zomer en najaar

Behandeladviezen;

- Overleg met de dierenarts over het te gebruiken middel
- Kies de juiste dosering, weeg schapen eventueel!
- Laat 5% van de koppel onbehandeld (de beste dieren of ooien met een eenling)
- Controleer effectiviteit van behandeling 10-14 dagen na behandeling met een nieuw mestonderzoek
- Om problemen met wormeninfectie en resistentie te voorkomen, adviseren wij een degelijk omweidings-plan op te stellen: tot 1 juli iedere 3 weken op een schoon stuk land brengen, tot 1 september elke 2 weken omweiden naar schoon land.

Ontwormingsmiddelen

Alleen gebruiken op basis van mestonderzoek!

Werkzaam tegen maagdarmpwormen, tenzij anders vermeldt

	Dosering	Frequentie per dag	Duur in aantal dagen	Toedieningswijze	Wachttijd in dagen (vlees)
<i>Noromectin drench</i> <i>REG NL 09568</i>	2.5ml/10kg	1x	Eenmalig	Oraal	14d
<i>Cydectin 0,1%</i> <i>REG NL 8660</i>	1ml/5kg	1x	Eenmalig	Oraal	14d
<i>Bovex</i> <i>REG NL 8863</i>	1ml/5kg	1x	eenmalig	Oraal	16d
Werkt in veel gevallen alleen nog tegen Nematodirus. Rest van de wormen vaak resistent.					
<i>Eprinex multi</i> <i>REG NL 123108</i>	1ml/10kg	1x	Eenmalig	Over de rug	2d
Werkt ook tegen vliegen, mijten en luizen					
<i>Dectomax</i> <i>REG NL 9844</i>	1ml/50kg	1x	Eenmalig	In de spier	70d
Ook werkzaam tegen luizen en mijten					
<i>Endex</i> <i>REG NL 7978</i>	1ml/5kg	1x	eenmalig	oraal	42d
Ook werkzaam tegen leverbot. Niet werkzaam tegen larven rode lebmaagworm					
<i>Fasinex</i> <i>REG NL 7980</i>	1ml/5kg	1x	Eenmalig	Oraal	42d
Alleen bij leverbot					